

Informatie na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin

U bent vandaag gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.

Bijwerkingen

Het kan zijn dat u bijwerkingen ervaart. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Pijn en zwelling op de plaats van injectie
- Vermoeidheid
- Hoofdpijn
- Spierpijn
- Gewrichtspijn
- Koude rillingen, koorts

Ook opgezette lymfklieren, misselijkheid en overgeven komen voor.

De meeste bijwerkingen zijn binnen 2-3 dagen verdwenen. Als de pijn of koorts toch heftig is, kan paracetamol worden ingenomen.

Voor andere bijwerkingen na de vaccinatie neemt u contact op met uw eigen huisarts.

Wilt u bijwerkingen melden, dan kunt u dat bij Lareb doen via: www.lareb.nl

Moeten ik en mijn huisgenoten thuisblijven als ik koorts krijg na de vaccinatie?

Als u koorts heeft, die binnen 48 uur na de vaccinatie is ontstaan, is de kans groot dat het een bijwerking is van de vaccinatie. U kunt het beste zelf wel thuis blijven. Uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven.

Heeft u naast koorts ook nog andere klachten die passen bij corona, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, maak dan een [afspraak voor een coronatest](#). Blijf zelf thuis en uw huisgenoten blijven ook thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij twijfel kunt u overleggen met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Als u ná 48 uur na de vaccinatie koorts krijgt, kan er sprake zijn van corona. Laat u dan testen. U en uw huisgenoten moeten dan thuis blijven tot de testuitslag bekend is.